

FROGS AND MORE
EDISONSTRAAT 14
8013 PS ZWOLLE
TEL. 06 - 20 55 82 32
EMAIL: INFO@FROGSANDMORE.NL



Agalychnis lemur

Agalychnis lemur : is een klein en fragiel gebouwd dier. Mannelijke kikkers bereiken een lichaamslengte tot ongeveer 3 centimeter, terwijl vrouwelijke exemplaren met 4 cm iets groter zijn. De ogen zijn relatief groot en puilen duidelijk uit. De ogen hebben een zilverwitte iris en een verticale pupil.

De kikker heeft een schutkleur doordat de huid overdag geelgroen is en 's nachts roodbruin. Het is een nacht actief dier dat zich langzaam voortbeweegt door de bomen. De boomkikker voedt zich met insecten en andere kleine ongewervelde dieren.

Verspreidingsgebied : de soort komt voor in Midden-Amerika en wordt met uitsterven bedreigd. Agalychnis lemur is momenteel door de IUCN als kritiek geclassificeerd.

Het leefgebied van de kikker bestaat uit de regenwouden op een hoogte van 440 tot 1600 meter boven zeeniveau. Het verspreidingsgebied loopt in de Caribische regio van het noorden van Costa Rica tot in het westen van Panama en in de Pacifische regio van het noordwesten van Costa Rica tot in de Darién, het grensgebied van Panama met Colombia.

Terrarium : minimale afmeting terrarium voor circa 4/5 dieren is circa 70 x 70 x 50 cm l x h x d.

Het terrarium dient rijk beplant te zijn met oa, Phyllodendron, Anturium en monstera.

Een waterbak mag zeker niet ontbreken in het terrarium.

Temperatuur: overdag circa 23 graden Celsius en een nachtelijke afkoeling tot circa 18/20 graden Celsius.

Regelmatig sproeien en een hoge luchtvochtigheid en goede ventilatie evt door middel van een ventilator is noodzakelijk

FROGS AND MORE
EDISONSTRAAT 14
8013 PS ZWOLLE
TEL. 06 - 20 55 82 32
EMAIL: INFO@FROGSANDMORE.NL



Voedsel: Kleinere insecten, o.a. Krekels, vliegen, weide plankton en kleine treksprinkhanen kunnen worden gevoerd. De voedseldieren voor het voeren bestrooien met vitamine poeder.

Voortplanting :

De eieren worden afgezet aan de onderzijde van bladeren die boven het water hangen. en na circa 10-14 dagen komen de eieren uit en vallen in het water.

Na circa 2 maanden komen de jonge maki kikkers aan het land en hebben dan een afmeting van circa 1 cm en eten dan al grote fruitvliegen, na 6 maanden zijn ze volwassen..